

4. 予防接種

定期予防接種：対象者には、接種券が配付されます。

委託医療機関で接種券を提示すれば、無料で接種できます。

	接種を 始める月齢等	回数	接種間隔	標準的な接種期間
RSウイルス	妊娠 28 週 0 日	1 回	妊娠 28 週 0 日～36 週 6 日までの間に 1 回	妊娠 28 週 0 日～36 週 6 日まで
B型肝炎	生後 2 か月	3 回	27 日以上の間隔で 2 回接種後、初回接種から 139 日以上の間隔をあけて 1 回接種	生後 2 か月～生後 9 か月未満
ロタウイルス ※ 2 つのワクチンのうちいずれかひとつを接種	生後 2 か月 (生後 6 週から可能)	2 回	【ロタリックス】 27 日以上の間隔で 2 回接種	1 回目：生後 2 か月～14 週 6 日後まで 2 回目：1 回目接種後、24 週 0 日後まで
		3 回	【ロタテック】 27 日以上の間隔で 3 回接種	1 回目：生後 2 か月～14 週 6 日後まで 2/3 回目：1 回目接種後、32 週 0 日後まで
小児肺炎球菌ワクチン	生後 2 か月	3 回	27 日以上の間隔で接種	生後 2 か月～生後 7 か月未満
		1 回	初回 3 回接種終了後 60 日以上の間隔をあけて、生後 12 か月に至った日以降に接種	生後 12 か月～生後 15 か月未満
5 種混合 (ジフテリア、百日咳、ポリオ、破傷風、ヒブ)	生後 2 か月	3 回	20 日以上の間隔で接種	生後 2 か月～生後 7 か月未満
		1 回	初回 3 回を接種後、6 か月以上あける	初回 3 回を接種後、6 か月～18 か月未満
ヒブワクチン	生後 2 か月	3 回	27 日(医師が必要と認めるときは 20 日)以上の間隔で接種	生後 2 か月～生後 7 か月未満
		1 回	初回 3 回接種終了後 7 か月以上の間隔をあける	初回 3 回を接種後、7 か月～13 か月未満
2 種混合 (ジフテリア、破傷風)	11 歳	1 回	11 歳～13 歳未満の間に 1 回接種	11 歳
BCG	生後 5 か月	1 回	生後 12 か月未満のうちに 1 回接種	生後 5 か月～生後 8 か月未満

定期予防接種

	接種を始める月齢等	回数	接種間隔	標準的な接種期間
麻しん・風しん混合 ※1	1 歳	1 回	生後 12 か月～24 か月の間に 1 回接種	
		1 回	小学校入学前年度に 1 回接種	
水痘 (みずぼうそう)	1 歳	2 回	1 回目接種後、3 か月以上あけて 2 回目の接種	1 回目：生後 12 か月～15 か月未満 2 回目：1 回目接種後、6 か月～12 か月未満
日本脳炎	3 歳 (生後 6 か月から可能)	2 回	6 日以上の間隔をあけて接種	3 歳
		1 回	2 回目の接種後、6 か月以上をあける	4 歳
	9 歳	1 回	9 歳～13 歳未満の間に 1 回接種	9 歳
子宮頸がん予防ワクチン	中学 1 年生 (小 6 から可能)	2 回 初回接種 15 歳未満	【シルガード 9】 1 回目の接種を 15 歳になるまでに受ける場合 1 回目接種後少なくとも 5 か月以上あけて接種 ※接種間隔が 5 か月未満の場合は 3 回目の接種が必要	中学 1 年生
		3 回 初回接種 15 歳以上	1 回目の接種を 15 歳になってから受ける場合 1 回目接種後から 1 か月以上あけて 2 回目接種、2 回目から 3 か月以上あけて 3 回目接種	

※1 麻しん風しん混合ワクチンの特例対象者

次の対象者のうち、定期接種対象期間中に接種ができなかったと認められた場合は、令和 9 年 3 月 31 日まで公費での接種が可能となります。

麻しん風しん(第 1 期)特例対象者：令和 4 年 4 月 2 日～令和 5 年 4 月 1 日生まれの方

麻しん風しん(第 2 期)特例対象者：平成 30 年 4 月 2 日～平成 31 年 4 月 1 日生まれの方

任意予防接種：助成事業のある予防接種のみ掲載

	助成対象	助成金額	助成回数
インフルエンザ (10～2 月)	生後 6 か月～中学 3 年生	不活化ワクチン 1,500 円	2 回
		生ワクチン 3,000 円	1 回
おたふくかぜ	1 歳～小学校入学前の幼児	3,000 円	1 回